



Hepatitis Prevention Program

Bureau of Communicable Diseases

Division of Disease Control and Health Protection

Florida Department of Health

Call your county health department for information on hepatitis testing and vaccination.

The Centers for Disease Control & Prevention (CDC), recommends all people born from 1945-1965 get tested for hepatitis C

www.flahepatitis.org

www.cdc.gov/hepatitis

Hepatitis A (HAV)

How do you get it?

Oral contact with feces from an infected person

- Eating food prepared by an infected person who did not clean hands properly
- Drinking contaminated water
- Eating raw contaminated shellfish
- Close personal contact (including sex & sharing a household)
- Oral-anal sexual practices

Hepatitis B (HBV)

Contact with infected person's blood/body fluids

- Sharing injection drug or tattooing equipment
- Unprotected anal, vaginal, or oral sex
- Infected mother to her infant during pregnancy or delivery
- Household contact
- Occupational exposure through needle stick

Hepatitis C (HCV)

Contact with infected person's blood

- Sharing injection drug or tattooing equipment
- Blood transfusion before 1992
- Infants born to a mother with hepatitis C
- Occupational exposure through needle stick
- Can be passed during sex, but this is not common

How do you prevent it?

Get vaccinated

- Wash your hands after using the bathroom, after changing a diaper, and before preparing or eating food
- Avoid sexual practices that result in oral-anal contact; or, use a latex barrier between the mouth and anus
- Cook shellfish thoroughly

Get vaccinated

- Don't share needles to inject drugs, tattooing equipment, razors, toothbrushes, or nail clippers
- Wear a condom every time you have sex
- Pregnant women screened for HBV and routine vaccination for all infants
- Use standard precautions in occupations which involve possible exposure to blood and body fluids

There is NO vaccine

- Avoid sharing injection drug equipment
- Don't share tattooing equipment, razors, toothbrushes, or nail clippers
- Use standard precautions in occupations which involve possible exposure to blood
- Wear a condom every time you have sex

What are the Symptoms?

In many cases symptoms may be absent or very mild

If present, may include any of the following:

- Yellow skin or eyes (jaundice)
- Feeling very tired
- Abdominal pain
- Loss of appetite
- Nausea
- Diarrhea

- Most children and many adults don't have symptoms
- Symptoms, if present, similar to hepatitis A

- Most people don't have symptoms
- Symptoms, if present, similar to hepatitis A
- Might not show any symptoms until 10-30 years after getting infected

How do you treat it?

- No treatment except management of symptoms
- Rest
- Don't drink alcohol—it can worsen liver disease
- Eat a healthy diet

- Medications are available for chronic illness
- Don't drink alcohol—it can worsen liver disease
- Get vaccinated for hepatitis A
- Eat a healthy diet
- Regular exercise

- Medications are available to treat chronic illness
- Don't drink alcohol—it can worsen liver disease
- Get vaccinated for hepatitis A and hepatitis B
- Eat a healthy diet
- Regular exercise



Programa de Prevención de la Hepatitis

Oficina de Enfermedades Transmisibles, División de
Control de Enfermedades y Promoción de Salud

Departamento de Salud de Florida

Llame al departamento de salud de su condado para obtener
información sobre pruebas y vacunación contra la hepatitis.

Centros Para el Control y Prevención de Enfermedades
recomienda que todas las personas nacidas entre el
1945-1965 se hagan la prueba de hepatitis C.

www.flahepatitis.org
www.cdc.gov/hepatitis

Hepatitis A (VHA)

Hepatitis B (VHB)

Hepatitis C (VHC)

¿Cómo se contrae?

Contacto oral con heces de una persona infectada

- Comer comidas preparadas por una persona infectada que no se lavó las manos correctamente
- Beber agua contaminada
- Comer mariscos crudos contaminados
- Contacto personal estrecho (incluyendo sexo y compartir un hogar)
- Prácticas sexuales orales y anales

Contacto con la sangre o los fluidos corporales de una persona infectada

- Compartiendo equipo de drogas inyectada o tatuajes
- Sexo anal, vaginal u oral sin protección
- Madre infecta a su bebé durante el embarazo o parto
- Contacto en un hogar
- Exposición laboral a través de la aplicación de una aguja

Contacto con la sangre de una persona infectada

- Compartiendo equipo de drogas inyectada o tatuajes
- Transfusión de sangre antes de 1992
- Bebés nacidos de una madre con hepatitis C
- Exposición laboral a través de la aplicación de una aguja
- Se puede transmitir durante el sexo, pero no es común

¿Cómo se previene?

Vacúñese

- Lávese las manos después de usar el baño, después de cambiar un pañal y antes de preparar o comer alimentos
- Evite las prácticas sexuales que resulten en contacto oral y anal; o use una barrera de látex entre la boca y el ano
- Cocine bien los mariscos

Vacúñese

- No comparta: agujas para inyectar drogas, equipos para tatuar, maquinillas de afeitar o cepillos de dientes
- Use un condón siempre que tenga sexo
- Pruebas de detección de HBV para las mujeres embarazadas y vacunación rutina para todos los bebés
- Use precauciones estándar en los trabajos que impliquen una posible exposición a sangre y fluidos corporales

NO existe una vacuna

- Evite compartir equipo de inyección de drogas
- No comparta equipos para tatuar, maquinillas de afeitar, cepillos de dientes o cortauñas
- Use precauciones estándar en los trabajos que impliquen una posible exposición a sangre
- Use un condón siempre que tenga sexo

¿Cuáles son los síntomas?

En muchos casos, los síntomas pueden ser muy leves o inexistentes

Si se presentan, podrían incluir cualquiera de los siguientes casos:

- Piel u ojos amarillentos (ictericia)
- Mucho cansancio
- Dolor abdominal
- Pérdida de apetito
- Náuseas
- Diarrea

- La mayoría de los niños y muchos adultos no presentan síntomas
- En caso de presentarse, los síntomas son similares a los de la hepatitis A

- La mayoría de las personas no presentan síntomas
- En caso de presentarse, los síntomas son similares a los de la hepatitis A
- Podrían no presentarse síntomas hasta los 10-30 años posteriores a la infección

¿Cómo se trata?

- No hay tratamiento, excepto el control de los síntomas
- Descanse
- No beba alcohol, ya que puede empeorar la enfermedad del hígado
- Coma una dieta saludable

- Hay medicamentos disponibles para la enfermedad crónica
- No beba alcohol, ya que puede empeorar la enfermedad del hígado
- Vacúñese contra la hepatitis A
- Coma una dieta saludable
- Haga ejercicio con regularidad

- Hay medicamentos disponibles para tratar la enfermedad crónica
- No beba alcohol, ya que puede empeorar la enfermedad del hígado
- Vacúñese contra la hepatitis A y la hepatitis B
- Coma una dieta saludable
- Haga ejercicio con regularidad